Proposta de resolução

1.1. Para determinar a amplitude do ângulo VAC vamos determinar os vetores $\overrightarrow{AV}$ e $\overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{AV} = V - A = (3, -1, 2) - (2, 1, 0) = (1, -2, 2).$$

$$\overrightarrow{AC} = C - A = (0, -1, 2) - (2, 1, 0) = (-2, -2, 2).$$

$$\begin{aligned} \cos(\overrightarrow{AV} \wedge \overrightarrow{AC}) &= \frac{\overrightarrow{AV} \cdot \overrightarrow{AC}}{\|\overrightarrow{AV}\| \times \|\overrightarrow{AC}\|} \\ \Leftrightarrow \cos(\overrightarrow{AV} \wedge \overrightarrow{AC}) &= \frac{(1, -2, 2) \cdot (-2, -2, 2)}{\|(1, -2, 2)\| \times \|(-2, -2, 2)\|} \\ \Leftrightarrow \cos(\overrightarrow{AV} \wedge \overrightarrow{AC}) &= \frac{-2 + 4 + 4}{\sqrt{1+4+4} \times \sqrt{4+4+4}} \\ \Leftrightarrow \cos(\overrightarrow{AV} \wedge \overrightarrow{AC}) &= \frac{6}{3\sqrt{12}} \\ \Leftrightarrow \overrightarrow{AV} \wedge \overrightarrow{AC} &\approx 55^\circ. \end{aligned}$$

1.2. Para determinar uma equação do plano que contém a base da pirâmide, vamos começar por determinar um vetor normal ao plano.

Seja M o ponto médio do segmento de reta $[AC]$. Então

$$M = \left(\frac{2+0}{2}, \frac{1-1}{2}, \frac{0+2}{2} \right) = (1, 0, 1).$$

Como $\overrightarrow{MV}$ é um vetor normal ao plano ABC e

$$\overrightarrow{MV} = V - M = (3, -1, 2) - (1, 0, 1) = (2, -1, 1),$$

a sua equação cartesiana é da forma

$$2x - y + z + d = 0,$$

onde $d \in \mathbb{R}$.

Substituindo $A(2, 1, 0)$ na equação temos

$$2 \times 2 - 1 + 0 + d = 0 \Leftrightarrow d = -3$$

e podemos concluir que $2x - y + z - 3 = 0$ é uma equação do plano pretendido.

2.1. Sabemos que se $X \sim N(\mu, \sigma)$ então:

$$P(\mu - \sigma < X < \mu + \sigma) \approx 0.6827$$

$$P(\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma) \approx 0.9545$$

$$P(\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma) \approx 0.9973$$

Consideremos o gráfico seguinte, que ilustra parte destas propriedades.

Deste modo, como $X \sim N(5, 0.5)$, então

$$P(X > \mu + 2\sigma) = P(X > 6) \approx 0.023.$$

A opção correta é a **(C)**.

2.2. Vamos fazer uso do facto de $\lim (1 + \frac{k}{n})^n = e^k$.
 $\lim (\frac{n-2}{n})^{3n} = (\lim (1 + \frac{-2}{n})^n)^3 = (e^{-2})^3 = e^{-6} = \frac{1}{e^6}$.
 A opção correta é a **(C)**.

3.1. Consideremos, relativamente à experiência de escolha aleatória de escolha de uma bola, os acontecimentos:

A : “a bola é amarela”;

L : “a bola ter o logotipo desenhado”.

Dos dados do enunciado podemos concluir que

$$P(\overline{A} \cup \overline{L}) = \frac{15}{16}. \text{ Deste modo,}$$

$$P(\overline{A} \cup \overline{L}) = \frac{15}{16}$$

$$\Leftrightarrow P(A \cap L) = \frac{15}{16}$$

$$\Leftrightarrow 1 - P(A \cap L) = \frac{15}{16}$$

$$\Leftrightarrow P(A \cap L) = \frac{1}{16}.$$

Como as bolas são indistinguíveis ao tato e são selecionadas ao acaso, a Lei de Laplace garante que

$$P(A \cap L) = \frac{1}{16}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\#(A \cap L)}{\#E} = \frac{1}{16}$$

$$\Leftrightarrow \frac{3}{\#E} = \frac{1}{16}$$

$$\Leftrightarrow \#E = 48.$$

Podemos concluir que a caixa contém 48 bolas.

3.2. Vamos determinar a probabilidade pedida recorrendo à Lei de Laplace.

Para determinar os casos favoráveis vamos recorrer ao esquema seguinte e ao Princípio fundamental da contagem.

Relativamente aos casos favoráveis temos:

$$3! \times 7! \times 8$$

→ Há 8 modos de colocar as bolas com logotipo juntas

→ Há 7! permutações das bolas sem logotipo

→ Há 3! permutações das bolas com logotipo

Uma vez que os casos possíveis são 10!, correspondentes às permutações das 10 bolas, a probabilidade pedida é

$$\frac{3! \times 7! \times 8}{10!} = \frac{1}{15}.$$

A opção correta é a **(B)**.

4. Começamos por notar que, para os números serem:

- ímpares, o último algarismo deve ser 5 ou 7;
- superiores a seis milhões, o primeiro algarismo deve ser 6 ou 7.

A divisão das diferentes situações em três casos e a respetiva esquematização clarificam a resolução do problema.

Caso 1: o primeiro algarismo é 6 e o último 5:
O esquema seguinte exemplifica a situação.

6 5 6 7 6 6 5

Como nos algarismos que não estão nos extremos há três algarismos iguais a 6 então há $\frac{5!}{3!}$ números nestas condições.

Caso 2: o primeiro algarismo é 6 e o último 7:
O esquema seguinte exemplifica a situação.

6 5 6 5 6 6 7

Como nos algarismos que não estão nos extremos há três algarismos iguais a 6 e dois iguais a 5 então há $\frac{5!}{2!3!}$ números nestas condições.

Caso 3: o primeiro algarismo é 7 e o último 5:
O esquema seguinte exemplifica a situação.

7 5 6 6 6 6 5

Como nos algarismos que não estão nos extremos há quatro algarismos iguais a 6 então, apenas a troca da posição do 5 origina números diferentes. Há 5 números nestas condições.

No total temos $\frac{5!}{3!} + \frac{5!}{2!3!} + 5 = 35$ números.

5. O problema pode ser equacionado com $d = x + 9$.
Como $r_1 = 7$ e $r_2 = 8$ temos

$$\begin{aligned} d &= x + 9 \\ \Leftrightarrow \frac{\sqrt{[(7+8)^2 - x^2]} [x^2 - (7-8)^2]}{x} &= x + 9 \\ \Leftrightarrow \frac{\sqrt{(225 - x^2)(x^2 - 1)}}{x} &= x + 9 \end{aligned}$$

e $]r_2 - r_1, \sqrt{r_2^2 - r_1^2}[=]1, \sqrt{15}[$.

Introduzindo na calculadora gráfica as expressões $y = \frac{\sqrt{(225-x^2)(x^2-1)}}{x}$ e $y = x + 9$ e recorrendo às suas potencialidades, obtemos os gráficos seguintes e o seu ponto de interseção no intervalo $]1, \sqrt{15}[$.

Podemos concluir que $x \approx 1.4$.

6. $\bar{z} = -1 - 2i$.

Sendo $\theta \in [0, 2\pi[$, como o afixo de $\bar{z}$ pertence ao 3.º quadrante,

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{-2}{-1} \Leftrightarrow \theta = \operatorname{tg}^{-1}(2) + \pi \Leftrightarrow \theta \approx 4.25 \in \left] \frac{5\pi}{4}, \frac{3\pi}{2} \right[.$$

A opção correta é a (D).

7. Como $r > 1$ e $a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$, a sucessão (a_n) é monótona crescente.

Sejam a_p e a_{p+1} dois termos consecutivos da sucessão.

$$\begin{aligned} \begin{cases} a_p + a_{p+1} = 12 \\ a_{p+1} - a_p = 3 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} a_p + r \times a_p = 12 \\ r \times a_p - a_p = 3 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} a_p = \frac{12}{1+r} \\ a_p(r-1) = 3 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} \text{---} \\ \frac{12r-12-3-3r}{1+r} = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \text{---} \\ 9r - 15 = 0 \wedge r \neq -1 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} a_p = \frac{9}{2} \\ r = \frac{5}{3} \end{cases} \end{aligned}$$

Podemos concluir que a razão é igual a $\frac{5}{3}$.

8.

$$\begin{aligned} \ln(a^2 - b^2) - 2 \ln(a + b) &= \ln(a - b) + \ln(a + b) - 2 \ln(a + b) \\ &= \ln(a - b) - \ln(a + b) = \ln(a - b) - \ln(2(a + b)) \\ &= \ln(a - b) - [\ln 2 + \ln(a + b)] = -\ln 2 \approx -0.7. \end{aligned}$$

Podemos concluir que a opção correta é a (C).

9.1. Note-se que $\vec{n}_\alpha(1, 1, 1)$ e $\vec{n}_\beta(2, 2, 2)$ são vetores normais aos planos α e β , respetivamente. Como $\vec{n}_\beta = 2\vec{n}_\alpha$, os planos α e β são paralelos. Por outro lado,

$$x + y + z = 1 \Leftrightarrow 2x + 2y + 2z = 2 \Leftrightarrow 2x + 2y + 2z = 1$$

permite-nos concluir que os planos α e β são estritamente paralelos. Consequentemente, a interseção dos três planos é o conjunto vazio.

Um outro modo de concluir o pretendido é através da resolução do sistema seguinte:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x + y + z = 1 \\ 2x + 2y + 2z = 1 \\ x + y = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 2y + 2z = 2 \\ 2x + 2y + 2z = 1 \\ \text{---} \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = 2 \\ \text{---} \\ \text{---} \end{cases} \end{aligned}$$

Como o sistema é impossível, a interseção dos três planos é o conjunto vazio.

Podemos concluir que a opção correta é a (A).

9.2. Como a área do círculo é 9π ,

$$\pi \times \overline{OF_2}^2 = 9\pi \Leftrightarrow \overline{OF_2} = \pm 3.$$

Consequentemente, o diâmetro do círculo é igual a 6. Como a distância focal, $2c$, e o eixo menor da elipse, $2b$, são iguais ao diâmetro do círculo então

$$2c = 2b = 6 \Leftrightarrow c = b = 3.$$

Uma vez que $b^2 + c^2 = a^2$ então

$$3^2 + 3^2 = a^2 \Leftrightarrow a^2 = 18.$$

Assim, a equação reduzida da elipse é

$$\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} = 1.$$

A opção correta é a **(A)**.

10.

$$\begin{aligned} w &= \frac{z_1 + i^6 + 2\bar{z}_1}{z_1 - z_2} \\ &= \frac{3 + 4i - 1 + 6 - 8i}{-1 - 2i} \\ &= \frac{8 - 4i}{-1 - 2i} \\ &= \frac{(8 - 4i)(-1 + 2i)}{(-1 - 2i)(-1 + 2i)} \\ &= \frac{20i}{5} = 4i. \end{aligned}$$

Assim,

- $|z| = |w| \Leftrightarrow |z| = 4$ representa, no plano de Argand, a circunferência centrada na origem com raio 4;
- $\text{Im}(z) \geq 0$ representa os complexos cujo afixo se encontra no eixo real ou acima deste;
- $\text{Re}(z) \geq 0$ representa os complexos cujo afixo se encontra no eixo imaginário ou à direita deste.

Na figura seguinte está representada no plano de Argand a região definida pela condição

$$|z| = |w| \wedge \text{Im}(z) \geq 0 \wedge \text{Re}(z) \geq 0.$$

Trata-se de um arco de circunferência.

Como o perímetro da circunferência completa é $2\pi \times 4 = 8\pi$, o perímetro do arco de circunferência é $\frac{8\pi}{4} = 2\pi$ unidades de comprimento.

11. $2 \cos x + 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = -\frac{1}{2}$.

Como $-\frac{2\pi}{3} \in [-\pi, 0]$ e $\cos(-\frac{2\pi}{3}) = -\frac{1}{2}$ então a opção correta é a **(B)**.

12.1. Consideramos a seguinte tabela de dupla entrada com todas as somas possíveis.

$1.^\circ \setminus 2.^\circ$	-1	1	1	1	1	1
-1	-2	0	0	0	0	0
1	0	2	2	2	2	2
1	0	2	2	2	2	2
1	0	2	2	2	2	2
1	0	2	2	2	2	2
1	0	2	2	2	2	2

Começemos por notar que $S_X = \{0, -2, 2\}$.

Como $P(X = 0) = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$, $P(X = -2) = \frac{1}{36}$ e $P(X = 2) = \frac{25}{36}$, então $k = 0$ e podemos concluir que a opção correta é a **(A)**.

12.2. O período de um oscilador harmónico definido por $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, onde $A > 0$, $\omega > 0$ e $\phi \in [0, 2\pi[$, é dado por $P = \frac{2\pi}{\omega}$. Como $\frac{2\pi}{\pi} = 2$, o período é 2.

Podemos concluir que a opção correta é a **(A)**.

13.1. Se $x > 0$,

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1(x - \ln x) - x(1 - \frac{1}{x})}{(1 - \ln x)^2} \\ &= \frac{x - \ln x - x + 1}{(1 - \ln x)^2} \\ &= \frac{1 - \ln x}{(1 - \ln x)^2}. \end{aligned}$$

Assim, $f'(1) = \frac{1 - \ln 1}{(1 - \ln 1)^2} = 1$ e a equação reduzida da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abcissa 1 é da forma $y = x + b$, $b \in \mathbb{R}$.

Como $f(1) = \frac{1}{1 - \ln 1} = 1$ então $T(1, 1)$ é um ponto da reta tangente em estudo.

Substituindo as coordenadas de T na equação $y = x + b$ temos

$$1 = 1 + b \Leftrightarrow b = 0.$$

Podemos concluir que $y = x$ é a equação reduzida da reta tangente ao gráfico de f no ponto de abcissa 1.

13.2. Para f ser contínua, tem que se verificar:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0).$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - \cos x}{x} \\ &= \frac{0}{0} \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{x(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1 - \cos^2 x}{x(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin^2 x}{x(1 + \cos x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} \times \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{1 + \cos x} \\ &= 1 \times \frac{0}{1 + 1} = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x - \ln x} \\ &= \frac{0}{0 - \ln 0^+} = \frac{0}{0 - (-\infty)} = 0. \end{aligned}$$

Como $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0$ então f é contínua no ponto 0.

14.1. $D_g = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Para estudar a monotonia e a existência de extremos

da função g vamos começar por determinar a derivada e os seus zeros. $g'(x) = \frac{-e^{-x} \times x - e^{-x} \times 1}{x^2} = \frac{e^{-x}(-x-1)}{x^2}$.

$$\begin{aligned} g'(x) = 0 &\Leftrightarrow e^{-x}(-x-1) = 0 \wedge x^2 \neq 0 \\ &\Leftrightarrow (e^{-x} = 0 \vee -x-1 = 0) \wedge x \neq 0 \\ &\Leftrightarrow x = -1. \end{aligned}$$

Na tabela seguinte é apresentado o estudo do sinal de g' e da monotonia de g .

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
e^{-x}	+	+	+	+
$-x-1$	+	0	-	-
x^2	+	+	0	+
$g'(x)$	+	0	-	-
g	$\nearrow$		$\searrow$	$\searrow$

Podemos concluir que g é crescente em $] -\infty, -1[$ e decrescente em $[-1, 0[$ e em $]0, +\infty[$.

$g(-1) = \frac{e}{-1} = -e$ é máximo relativo.

14.2. O declive da assíntota oblíqua é dado por

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{x}.$$

Como $h(x) = g(x) + 2x - \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{e^{-x}}{x} + 2x - \frac{1}{\sqrt{x}}$,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{h(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^{-x}}{x^2} + 2 - \frac{1}{x\sqrt{x}} \right) \\ &= \frac{0}{+\infty} + 2 - \frac{1}{+\infty} = 2. \end{aligned}$$

Podemos concluir que a opção correta é a **(B)**.

15. Seja α a inclinação da reta OB . Como o seu declive é $\frac{4}{3}$ então $\tan \alpha = \frac{4}{3}$.

A inclinação da reta r é $\frac{\alpha}{2}$ e o seu declive $\tan \frac{\alpha}{2}$.

Como $\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$ então

$$\tan(2a) = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}.$$

Assim, $\tan \alpha = \tan \left(2 \times \frac{\alpha}{2} \right) = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}$.

Se $1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2} \neq 0$ temos

$$\begin{aligned} \tan \alpha = \frac{4}{3} &\Leftrightarrow \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{4}{3} \\ &\Leftrightarrow 6 \tan \frac{\alpha}{2} = 4 - 4 \tan^2 \frac{\alpha}{2} \\ &\Leftrightarrow 4 \tan^2 \frac{\alpha}{2} + 6 \tan \frac{\alpha}{2} - 4 = 0 \\ &\Leftrightarrow \tan \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2} \vee \tan \frac{\alpha}{2} = -2. \end{aligned}$$

Como a reta r tem declive positivo e passa na origem, podemos concluir que a sua equação reduzida é $y = \frac{1}{2}x$.